



بیمارستان امتیاز و فوریت های جراحی
شهید رجایی

سکته قلبی / سکته مغزی



تهیه کننده: سودابه رزمی
کارشناس ارشد پرستاری
تاریخ تهیه: زمستان ۱۳۹۸

دلیل مصرف کم این دارو در این مرکز این دارو در داروخانه نگهداری می شود.
کارشناس ۲۴۷ و ۷۲۴ در این مرکز سرکار خانم صادقی (معاون پرستاری) می باشند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل کامل سکته قلبی/سکته مغزی در درایو اطلاعات بیمارستانی-آموزش ضمن خدمت قرار داده شده است.

منابع:

1- Smeltzer S, Bare B. Brunner & Suddarth's Text book of Medical Surgical Nursing. (2018). Lippincott Williams &Wilkins 12th ed

۲. دستورالعمل اجرایی کشوری مدیریت درمان سکته حاد مغزی

۳. دستورالعمل اجرایی کشوری مدیریت درمان سکته حاد قلبی

نشانی: شیراز-بلوار چمران-جنب بیمارستان چمران-بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی

با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید

۵

- ✓ بی حسی یا ضعف ناگهانی (مخصوصا در یک سمت بدن)
- ✓ سردرد شدید ناگهانی
- ✓ لکنت زبان
- ✓ مشکل در تعادل و بینایی

رتپلاز (Retepase):

داروی انتخابی در درمان سکته مغزی می باشد. داروی دیگری است از دسته ترومبولیتیک ها و بر اساس مطالعات بالینی نتایجی معادل آلتپلاز دارد. دوز آن به صورت دو بولوس ۱۰ واحدی وریدی است که به فاصله ۳۰ دقیقه تجویز می شود.

عوارض دارویی:

- ✓ خونریزی
- ✓ تب
- ✓ تهوع و استفراغ
- ✓ افت فشار خون
- ✓ سرگیجه
- ✓ سردرد شدید
- ✓ خون ریزی داخل جمجمه
- ✓ علائم آلرژیک یا آنافیلاکسی مانند تنگی نفس و کهیر

درخواست دارو:

پس از دستور پزشک بایستی پزشک درخواست کننده در برگ سرنسخه نیز دستور دارو را نوشته و سپس دارو توسط پرستار در سیستم HIS چارج گردد و پس از استفاده از دارو جهت تاییدیه بیمه، نسخه دستی به همراه کپی دستور پزشک به داروخانه تحویل داده می شود. به

۴

کد ۲۴۷:

کدی است که برای بیمار علائم سکته حاد مغزی در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز توسط بیمارستان های مشمول طرح صورت می پذیرد.

کد سکته قلبی جهت مدیریت درمان بیماران با علائم مشخصه ایسکمی حاد میوکارد همراه با بالا رفتن پایدار قطعه ST یا LBBB که به نظر می رسد جدید باشد.

سکته قلبی:

در دهه گذشته بیماری های قلبی عروقی به عنوان مهمترین علت مرگ و میر در دنیا مطرح و به صورت اپیدمی یا همه گیری جهانی شناخته می شوند. رتبه اول مرگ و میر در کشور ایران مربوط به بیماری های قلبی عروقی می باشد.

سکته قلبی با بالا رفتن قطعه ST در نوار قلبی همراه باشد که اصطلاحاً STEMI نامیده می شود، در اثر انسداد کامل یک رگ اصلی کرونر به وسیله لخته خونی رخ می دهد. این فرم وخیم ترین تظاهر سندروم حاد کرونری و تهدید کننده حیات می باشد.

علائم سکته قلبی:

✓ احساس فشار آزارنده، سنگینی یا درد در وسط قفسه سینه، کشیده شدن درد به شانه ها، گردن، بازوها و فک پایین، احساس سبکی سر، سرگیجه شدید بدون علت، سنکوپ، تنگی نفس، عرق کردن و ناراحتی معده، تهوع و استفراغ

در صورت فعال شدن کد ۲۴۷ به محض ورود بیمار به بیمارستان از بیمار ECG گرفته می شود و به پزشک اورژانس اطلاع داده می شود، در صورت تایید ۲۴۷ (سکته

قلبی) به پزشک کاردیولوژیست جهت ویزیت بیمار اطلاع داده و پس از حاضر شدن وی دارو درمانی با دستور وی شروع می شود و در اسرع وقت با هماهنگی با MCMC بیمار به بیمارستان ۲۴۷ اعزام می گردد.

کد ۷۲۴:

کدی است که برای بیمار علائم سکته حاد مغزی در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز توسط بیمارستان های مشمول طرح صورت می پذیرد.

در صورت فعال شدن کد ۷۲۴ به محض ورود بیمار به بیمارستان و پس از اطلاع به پزشک اورژانس جهت بیمار Brain CT انجام شده و در صورت تایید سکته مغزی به پزشک نورولوژیست جهت ویزیت بیمار اطلاع داده و پس از حضور وی دارودرمانی با دستور وی شروع می شود و در اسرع وقت با هماهنگی با MCMC بیمار به بیمارستان ۷۲۴ اعزام می گردد.

سکته مغزی:

سکته مغزی یعنی قطع کامل جریان خون به قسمتی از مغز می باشد و زمانی رخ می دهد که یک رگ خونی تغذیه کننده مغز دچار پارگی یا گرفتگی گردد.

علائم FAST:



MRS:

محاسبه دامنه حرکتی بیمار است. جهت توضیحات بیشتر به فایل سکته قلبی/سکته مغزی در درایو اطلاعات بیمارستانی-آموزش ضمن خدمت مراجعه نمایید.

داروهای مورد استفاده:

✓ آلتیپلاز (Alteplase)

✓ رتیلپلاز (Reteplase)

آلتیپلاز (Alteplase):

داروی انتخابی در درمان سکته مغزی می باشد. این دارو به دلیل اختصاصی بودن برای فیبرین تخلیه فیبرینوژن کمتری ایجاد می کند و با واکنش های آلرژیک و افت فشار خون کمتری نسبت به استرپتوکیناز همراه است. دوز آن به صورت زیر است:

✓ بولوس ۱۵ میلی گرم

✓ انفوزیون ۰,۷۵ mg/kg برای ۳۰ دقیقه (حداکثر ۵۰ میلی گرم)

✓ ۵۰ میلی گرم)

✓ انفوزیون ۰,۵ mg/kg (حداکثر ۳۵ میلی گرم)

✓ برای ۶۰ دقیقه بعدی

عوارض دارویی:

✓ واکنش آلرژیک مانند کهپیر، تنفس سخت، تورم

صورت، لب ها، زبان یا گلو

✓ خون ریزی (خون ریزی بینی، خون ریزی لثه،

خون ریزی از محل زخم ها، بریدگی ها، کاتتر و

....)

✓ مدفوع خونی، سرفه های خونی

✓ هماچوری