



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان حاج محمد اسماعیل امینی

مرکز فورینهای جراحی شوید رجایی

دستورالعمل جمع آوری نمونه VMA (وانیل مندلیک اسید)

Edup-pam-91-00

۱۰- از مصرف چای ، قهوه ، کاکائو، وانیل، موز، شرین بیان، مرکبات ، شکلات و مصرف داروهای کافئین، اپی نفرین، لودپا، لیتیوم، کلونیدین، مهار کننده منوآمینواکسیداز MAO ، مواد حاصل (حاوی ید) ، اسپرین و داروهای ضد فشارخون جلوگیری شود .

۱- نمونه ادرار ۲۴ ساعته را جمع آوری کنید (از ظرف مخصوص جهت جمع آوری نمونه استفاده کنید .)

۲- بعد از تخلیه ادرار و دور ریختن اولین نمونه، اقدام به جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته نموده و زمان شروع جمع آوری را یاداشت کنید .

۳- تمام ادرار تخلیه شده از نقطه شروع تا انتهای ۲۴ ساعت را جمع آوری کرده و در طی مدت جمع آوری نمونه را در یخچال، جای خنک یا روی یخ نگهداری نمایید .

۴- حجم ادرار جمع آوری شده به ازای هر ساعت را در یک جای مشخص ثبت کنید تا از هدر رفتن تصادفی نمونه اجتناب شود .

۵- بیمار باید حتما قبل از اجابت مزاج نمونه گیری کند تا از آلوده شدن ادرار با مدفوع جلوگیری شود.

۶- بیمار باید در طول جمع آوری نمونه مایعات زیاد بنوشد .

۷- آخرین نمونه را تا حدامکان در لحظه پایان ۲۴ ساعت جمع آوری کنید و این ادرار را نیز به ظرف جمع آوری اضافه کنید .

۸- زمان جمع آوری آخرین نمونه را روی برگ آزمایشگاه یا ظرف جمع آوری نمونه یاداشت کنید .

۹- عواملی که سبب استرس و اضطراب بیمار می شود را مشخص کرده و آن ها را کاهش دهید .



واحد آموزش به بیمار
تهریه کننده علمی: دکتر امیر رضا دهقانیان - فلوشیپ
مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک متخصص پاتولوژی
جراحی و کلینیکال
تاریخ تهیه: تابستان ۱۴۰۱
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله متدهای
از مایشگاهی ۲۰۲۲ - هنری دیویدسون ۲۰۲۲