



دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز  
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی  
دستورالعمل جمع آوری مدفوع

Edup-pam-89-00

۲. الزاما تمام نمونه ها را در مدت 4 روز جمع آوری نماید و روزانه به آزمایشگاه تحویل دهد .
۳. در صورت خونریزی از لثه از تمیز کردن دهان و دندان و مسواک زدن و کشیدن نخ دندان جلوگیری کند .
۴. بعد از جمع آوری نمونه ، آن را سریع به آزمایشگاه تحویل دهد .



۱. بیماران باید نمونه های مدفوع را در ظرف پاکیزه ای که درب آنها محکم بسته می شود و نشستی ندارد گرد آوری نماید
۲. در صورت مشاهده کرم و هر مورد مشکوک این قضیه را حتما به آزمایشگاه اطلاع دهید.
۳. قبل از نمونه گیری از مصرف روغن کرچک ، بیسموت منیزیم ، ترکیبات ضد اسهال و تنقیه با باریم ، مصرف آنتی بیوتیک خودداری نمایند .
۴. دقت کنند که مدفوع با آب و ادرار آلوده نشود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را نابود سازد .
۵. هنگامی که بیمار اسهال آبکی یا خونی دارد هر چه سریعتر ترجیحا در 4 روز اول بیماری پیش از شروع درمان آنتی بیوتیک نمونه گیری صورت گیرد و نمونه را سریع ظرف مدت ۳۰ دقیقه به آزمایشگاه انتقال دهند.

#### راهنمای نمونه گیری جهت بررسی خون مخفی در مدفوع:

۱. بیمار باید قبل از انجام آزمایش به مدت 3 روز از مصرف اسید اسکوربیک ، آهن خوراکی ، آسپرین و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ، بروفن و انواع گوشت به خصوص گوشت قرمز و میوه و سبزیجات خودداری نماید .

واحد آموزش به بیمار  
تهیه کننده علمی: دکتر امیررضا دهقانیان-فلوشیپ  
مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک متخصص پاتولوژی  
جراحی و کلینیکال  
تاریخ تهیه: تابستان ۱۴۰۱  
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله متدهای  
آزمایشگاهی ۲۰۲۲ - هنری دیویدسون ۲۰۲۲