



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان حاج محمد اسماعیل امیار

مرکز فوریهای جراحی شید رجایی

دستورالعمل جهت نمونه گیری GCT (تست رقابت گلوکز)

Edup-pam-87-00



واحد آموزش به بیمار
تهیه کننده علمی: دکتر امیر رضا دهقانیان -
فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک
متخصص پاتولوژی جراحی و کلینیکال
تاریخ تهیه: تابستان ۱۴۰۱
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله متدهای
آزمایشگاهی ۲۰۲۲ - هنری دیویدسون ۲۰۲۲

۱. این تست در بانوان حامله به دلیل مرگ و میر نوزادان و شیوع بالای سقط جنین حائز اهمیت است که البته با درمان قابل پیشگیری خواهد بود.
۲. این آزمایش جهت تعیین دیابت بارداری برای خانم ها در خواست شده است.
۳. باید بیمار ناشتا یا غیر ناشتا مقدار ۵۰ گرم کلوکز یا پودر قند را در یک لیوان آب حل کرده و طی مدت ۵ دقیقه مصرف کند.
۴. بعد از ۱ ساعت آماده خونگیری شود.
۵. در این فاصله از مصرف قهوه، الکل و کشیدن سیگار خودداری نماید.