



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

Edup-pam-88-00

جمع آوری نمونه ادرار در اطفال



۱. نمونه های ادرار در اطفال و کودکان زیر ۲ سال با استفاده از کیسه های ادراری مخصوص صورت می گیرد.
۲. قبل از چسباندن کیسه منفذ و پوست اطراف منفذ را با آب و صابون تمیز شسته و با دستمال خشک کنید.
۳. بهتر است کیسه را هنگام خواب به کودک وصل کنید و پس از قرار دادن کیسه تا زمان جمع آوری ادرار هر ۱۵ دقیقه کیسه را بررسی نمایید تا جدا نشود.
۴. زمانی که میزان ۱۰-۱۵ میلی لیتر ادرار در کیسه جمع آوری شد باید فوراً کیسه را جدا کرده و آنرا تا کرده و جهت انتقال با چسب خودش بچسبانید و سریع آنرا به آزمایشگاه برسانید .
۵. در غیراینصورت کیسه را در ۲ نایلون گذاشته و حداکثر به مدت ۶ ساعت در یخچال نگه دارید و سپس به آزمایشگاه منتقل کنید.

واحد آموزش به بیمار
تهیه کننده علمی: دکتر امیررضا دهقانیان - فلوشیپ
مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک متخصص پاتولوژی
جراحی و کلینیکال
تاریخ تهیه: تابستان ۱۴۰۱
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله مندهای
آزمایشگاهی ۲۰۲۲ - هنری دیویدسون ۲۰۲۲

توجه: حتماً روی کیسه برچسب مربوط به
آسم و نوع آزمایش و کد پذیرش بیمار قید
شده باشد.