



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

Edup-pam-98-00

نمونه گیری کامل ادرار



۱. برای جمع آوری نمونه، اول صبح که غلیظ تر است مناسب ترین است .
۲. بیمار باید قبل از رفتن به بستر مثانه را تخلیه نماید و بلافاصله بعد از بیدار شدن نمونه ادرار را جمع آوری کند.
۳. قسمت اول آن یعنی (۲ ثانیه اول) را دور ریخته و قسمت وسط ادرار را در ظرف نمونه گیری به میزان حداقل نصف ظرف جمع آوری نماید
۴. نمونه را طی مدت حداکثر ۱ ساعت به آزمایشگاه تحویل دهد.
۵. توجه کنید قبل از نمونه گیری از مصرف زیاد مایعات خودداری نمایید

راهنما جهت نمونه گیری ادرار بیماران دیابتی

واحد آموزش به بیمار
تهیه کننده علمی: دکتر امیررضا دهقانیان-فلوشیپ
مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک متخصص پاتولوژی
جراحی و کلینیکال
تاریخ تهیه: تابستان ۱۴۰۱
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله متدهای
آزمایشگاهی ۲۰۲۲ - هنری دیویدسون ۲۰۲۲

۱. با این روش گلوکز و کتون ادرار کنترل می شود و بیمار باید ابتدا مثانه خود را تخلیه نماید .
۲. کمی بعد از آن دوباره ادرار نماید که نمونه دوم تازه تر است و برای آزمایش استفاده می شود که در آن زمان خاص غلظت اجزاء دقیق تر مشخص می شود .