



بیمارستان امتیاز و فوریت های جراحی
شهید رجایی



نحوه تزریق انسولین



تهیه کننده: فاطمه عباسپور
سوپر وایز آموزش سلامت

تاریخ تهیه: پاییز ۱۳۹۴

تاریخ بازبینی چهارم: پاییز ۱۴۰۲

تأثید کننده علمی: سرکار خانم دکتر منجدب
متخصص داخلی

Edup-pam-59-03

نکرده باید لازم است مجدداً یکی از موارد گفته شده را
صرف کنید.

نشانی: شیراز-بلوار چمران-جنوب بیمارستان چمران-
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های
جراحی شهید رجایی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: ۰۰۰۶۴۳۶۳۶۳
سایت: WWW.rajaeehosp.ac.ir، لینک راهنمای
مراجعین

منبع: بروفر سودارت ۲۰۲۲-کتاب خود آموز تزریق
انسولین/ قالیف مرکز تحقیقات دیابت/ پژوهشگاه علوم
غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام و نام خانوادگی / امضا فرد آموزش گیرنده:

ماه و امضا پرستار آموزش دهنده:



با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه
می توانید فایل متنی پمفات را دانلود نمایید

آمده ان کاه با فشار اندکی به پیستون حباب ها را خارج
کنید.

نحوه تزریق:

۱- از بین نواحی تزریق یک محل را انتخاب کنید.

۲- محل تزریق باید تمیز باشد. در صورت استفاده از الکل
صبر کنید تا کاملاً خشک شود.

۳- با یک دست پوست ناحیه مورد نظر را صاف کرده و با
دو انگشت قسمتی از آن را گرفته و بی حرکت نگه دارید.

۴- با دست دیگر سرنگ را برداشته و همچون قلم در
دست بگیرید و سر سوزن را وارد پوست کنید.

۵- زاویه تزریق در افرا چاق ۹۰ درجه و در افراد لاغر
درجه میباشد.

۶- برای تزریق انسولین پیستون سرنگ را تا آخر فشار
دهید.

۷- به طور مستقیم سوزن را از پوست خارج کنید و یک
گلوه پنبه را برای چند ثانیه روی محل تزریق نگه
دارید. اگر بعد از بیرون کشیدن سوزن از پوست و پایان
تزریق ناحیه دردناک شد با مایعی روشن بیرون امد محل
تزریق را به مدت چند ثانیه فشار دهید.

۸- از ماساژ دادن محل بعد از تزریق بپرهیزید.

کاهش قند خون چیست؟

یکی از جدی ترین مشکلاتی که ممکن است پس از تزریق
انسولین به وجود آید کاهش قند خون است که قند به
کمتر از ۷۰ میلیسد. شخص حالت تزریق، گیجی، عصبانیت و
لرزش پیدا میکند. تاری دید، سردرد، سوزن سوزن شدن
یا بی حسی لب ها نیز از علائم دیگر افت قند خون
هستند.

با مشاهده این علائم باید خیلی سریع عمل کنید. سه حبه
قند را در نصف لیوان آب حل کرده یا نصف لیوان آب میوه
شیرین میل کنید. اگر بعد از ۱۵ دقیقه احساس بهبودی

۵

۴



مراحل تزریق انسولین چگونه است؟

نحوه کشیدن انسولین داخل سرنگ:

- ۱- ابتدا تمام وسایل مورد نیاز را بیاورید. سپس دستان خود را با آب و لرم و صابون بشویید و کاملاً خشک کنید.
- ۲- ویال های انسولین را از نظر وجود رسوبات، بخ زدگی بررسی کنید.

- ۳- قبل از کشیدن انسولین NPH به داخل سرنگ آن را بین دو دست خود بغلتایید تا یک دست شود. هرگز ویال انسولین را به شدت تکان ندهید. در صورتی که ویال جدیدی برداشته اید در پوش ویال را بردارید. سپس در پوش پلاستیکی آن را با پنیه الکلی تمیز کنید.



- ۴- به همان میزانی که انسولین لازم دارید هوا وارد ویال کنید. اگر از دو نوع انسولین استفاده میکنید هوا وارد هر دو ویال کنید.

- ۵- حالت ویال را برگردانید و میزان انسولین لازم را با کشیدن پیستون به عقب وارد سرنگ خود کنید.

- ۶- در صورتی که دو نوع انسولین تزریق میکنید ابتدا انسولین رگولار و سپس انسولین NPH را وارد سرنگ کنید.

- ۷- پس از کشیدن انسولین به داخل سرنگ، سرنگ را رو به بالا نگه داشته و حباب های هوا را خارج کنید. چند ضربه به بدنه سرنگ وارد کنید تا حباب های هوا به سطح

تزریق انسولین سرد در دنایک است پس ۳۰ دقیقه قبل از تزریق انسولین را از یخچال خارج کنید تا هم دمای اتاق شود.

هنگام خرد و استفاده از ویال انسولین به تاریخ انقضای آن توجه کنید.

از تکان داد شدید ویال انسولین پیرهیزید چرا که اثر دارو را کاهش میدهد.

فواصل تزریق در یک عضو را رعایت کنید. فاصله هر تزریق با تزریق قبلی باید $1/5 - 1$ سانتی متر باشد.

در صورتی که از پنبه الکلی استفاده میکنید آن قدر صبر کنید تا پوست خشک شود.

سرنگ انسولین:

سرنگ ۱ میلی لیتری: می تواند تا ۱۰۰ واحد انسولین را در خود جای دهد (هر درجه نشان دهنده ۲ واحد انسولین است).

نکات مهم برای تزریق انسولین: روش مناسب تزریق انسولین با استفاده از سرنگ و به صورت زیر جلدی است.

نواحی مختلفی برای تزریق انسولین وجود دارند. برای جلوگیری از پیدا شدن تغییرات پوستی و بافت چربی زیر ان تزریق انسولین باید به صورت چرخشی انجام شود. بنابر این در صورتی که بیش از یک تزریق در روز انجام میدهید، بهتر است از چند عضو جهت تزریق انسولین استفاده شود. به طور مثال تزریق انسولین را صبح ها در اطراف ناف و بعداز ظهر ها در ران یا بازو ها انجام دهید.

ورزش سرعت جذب انسولین از نواحی تزریق را افزایش میدهد و در صورت تزریق در اندام هایی که در ورزش فعالیت دارند احتمال بروز افت قند خون بیشتر میشود.

نواحی مجاز برای تزریق:

قسمتهای مختلفی چون ناحیه شکم، قسمت بالایی و بیرونی بازو ها، قسمت بیرونی عضله ران و قسمت بیرونی باسن برای تزریق انسولین مناسب هستند.

اشکال مختلف انسولین کدامند؟ این ترین نوع انسولین موجود در ایران انسولین NPH (کدر و شیری رنگ) و رگولار (شفاف و بیرنگ) هستند.

ویال های انسولین سالم چه ویژگی هایی دارند؟ ویال انسولین رگولار سالم کاملاً شفاف و یک دست به نظر میرسد.

ویال انسولین NPH سالم، پس از یک تکان ملایم و غلتاندن کف دست یک دست به نظر میرسد.

نشانه های ویال انسولین غیر قابل استفاده کدامند؟ پس از یک تکان ملایم انسولین در ته ویال معلق است. انسولین دانه دانه به نظر میرسد و یکنواختی خود را از دست داده است.

انسولین داخل ویال یخ زده است. شیوه نگه داری انسولین چگونه است؟

ویال های انسولین خود را در معرض سرما یا گرمای شدید قرار ندهید.

انسولین را دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید. برای مثال ویال انسولین را پشت شیشه پنجره افتاد گیر قرار ندهید.

هرگز ویال های انسولین را داخل فریزر، جایی، قرار ندهید. جرا که انسولین یخ زده قابل استفاده نیست.

در صورتی که قصد روج از خانه را دارید و هوا بیش از حد سرد یا گرم است، ویال های انسولین خود را در کیف هایی که عایق حرارتی دارد بگذارید.

انسولین های ذخیره خود را در قسمت یخچال قرار دهید.

انسولین هایی را که برای استفاده فعلی خود باز کرده اید و در حال مصرف آن هستید در دمای اتاق و دور از رطوبت، سرما و گرما نگه دارید.

ویال های انسولین باز شده ۲۸ تا ۳۰ روز قابل استفاده میباشد.