



بیمارستان امتیاز و فوریت های جراحی
شهید رجایی

نکات آموزشی مصرف داروی هیدروکسی کلروکین سولفات برای بیماران



تهیه کننده: فاطمه عباس پور
تاریخ تهیه: بهار ۹۹
تاریخ بازبینی اول: پاییز ۱۴۰۰
تایید کننده علمی: سرکار خانم دکتر کوشافر

Edup-pam-71-01

متورال، پروپرانول، بیزوپرولول، دیگوکسین، داپسون،
تاموکسیفن، داروهای گیاهی کاهنده قند خون، داروهای
اعصاب و روان

نحوه نگهداری دارو:

دارو را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. یخچال
محیط مرطوبی است که برای داروهای غیر یخچالی مناسب
نیست.

مصرف در زمان بارداری:

بسته به وخامت حال مادرو بررسی کامل ریسک آسیب
به مادر تجویز این دارو با صلاح دید پزشک ممکن است.
در صورت تشخیص باردار بودن، بدون مشورت با پزشک
داروی خود را قطع نکنید.

مصرف در زمان شیردهی:

به طور معمول بعد از بررسی سن و وزن نوزاد توسط
پزشک، شیردهی مورد قبول و ایمن است.

نشانی: شیراز-بلوار چمران-جنب بیمارستان چمران-بیمارستان حاج
محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی
شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: ۳۶۳۶۴۰۰۱
سایت: WWW.rajaeehosp.ac.ir. لینک راهنمای مراجعین
منبع: سامانه اطلاعات دارویی کشور



با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه
می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید

عوارضی که بروز آنها نیازمند قطع دارو و مراجعه فوری به پزشک است:

- ✓ در صورت بروز همزمان علائمی مانند تیره شدن رنگ ادرار،
ضعف و خستگی شدید، کاهش شدید اشتها، تهوع و دل درد،
زردی رنگ پوست و مدفوع کم رنگ، دارو را قطع کرده و به
پزشک مراجعه کنید.
- ✓ در صورت افت قند خون که علائم آن شامل ضعف و
خستگی، سردرد و گیجی، تپش قلب سریع، عرق کردن و
احساس گرسنگی می باشد، به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ در صورتی که در بدن خود متوجه عفونت جدیدی شوید.
- ✓ تغییرات بینایی مانند تاری دید، حرکات غیرارادی چشم که
معمولاً در مصرف طولانی مدت بیش از یک سال اتفاق می افتد.
- ✓ مشاهده کبودی زیر پوست یا خونریزی
- ✓ حرکات غیرعادی بدن و دست و پا، عدم تعادل، لرزش، ضعف
ماهچه ها همزمان با از دست دادن توان و انرژی شدید،
تشنج، تغییرات شدید در خلق و خو، کابوس های شبانه، کاهش
شنوایی یا وزوز گوش، ضربان قلب تند و غیرعادی (در حالت
درازکش یا استراحت بعد از 10 دقیقه، ضربان قلب طبیعی بین
۶۰ تا ۸۰ بار در یک دقیقه میباشد).
- ✓ تغییرات پوستی شامل تاول، قرمزی و ورم پوست، دهان، بینی
و چشم (علائم استیونز جانسون)

تداخلات دارویی:

در صورتی که از داروهای زیر استفاده می کنید، ممکن است نیاز به
تنظیم مقدار مصرف دارو توسط پزشک داشته باشید:

داروی هیدروکسی کلروکین:

قرص 200 میلی گرمی هیدروکسی کلروکین داروی انتخابی در درمان بیماران مبتلا به کرونا و ویروس جدید می باشد این دارو در کاهش قدرت کرونا و ویروس کووید 19 صرفاً منوط به تجویز و صلاحدید پزشک معالج می باشد.

نحوه مصرف داروی هیدروکسی کلروکین:

- ✓ دارو را همراه یک وعده غذای سبک یا همراه یک لیوان شیر مصرف نمایید این کار منجر به کاهش احتمال بروز تهوع میشود . همچنین جهت جلوگیری از بروز عوارض گوارشی و معده درد از خورد کردن یا جویدن قرص خودداری نمایید.
- ✓ در صورتی که در مدت درمان با این دارو از داروهای ضد سوءهاضمه مانند شربت های ضد اسید معده استفاده مینمایید، حتماً لازم است بین مصرف هیدروکسی کلروکین و این داروها حداقل 4 ساعت فاصله ایجاد نمایید زیرا داروهای ضد اسید معده اثر درمانی هیدروکسی کلروکین را کاهش می دهند.
- ✓ در صورت فراموشی یک نوبت مصرف هیدروکسی کلروکین به محض یادآوری دارو را مصرف نمایید مگر اینکه زمان کمی به نوبت بعدی مانده باشد در اینصورت نوبت فراموش شده را مصرف ننموده و نوبت بعدی را طبق روال سابق مصرف نمایید و از دو برابر نمودن مقدار مصرف هیدروکسی کلروکین در یک نوبت بپرهیزید.

نکته: چنانچه مصرف دارو دو مرتبه در روز برای شما تجویز شده باشد در صورت فراموشی یک نوبت تنها تا یک ساعت پس از زمان مقرر میتوانید آن را مصرف کنید.

نکات قابل توجه:

- ✓ میزان مصرف دارو و طول مدت درمان بستگی به نظر پزشک دارد و در افراد مختلف متفاوت است، لذا مطابق دستور پزشک دوره درمان خود را کامل کنید.
- ✓ ممکن است مصرف دارو حتی بعد از برطرف شدن علائم بیماری ادامه یابد، لذا در صورت احساس بهبودی، بدون مشورت با پزشک داروی خود را قطع نکنید.
- ✓ در صورتی که سابقه حساسیت به دارو یا ترکیبات جانبی قرص هیدروکسی کلروکین دارید، پزشک خود را مطلع کنید.
- ✓ در صورتی که از قبل سابقه بیماری شبکیه چشم که منجر به کاهش دید می شود دارید، پزشک خود را مطلع کنید.
- ✓ در صورتی که سابقه بیماری قلبی دارید پزشک خود را از جزئیات آن باخبر سازید. در صورت تشدید علائم قلبی (تنفس سخت حتی در حالت استراحت، تورم پاها و مچ پا، التهاب شکم به علت جمع شدن مایع، سرفه در حالت درازکشیده، خستگی، ضربان سریع قلب، فشار روی قفسه سینه، سرگیجه) مصرف دارو را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ در صورت مصرف طولانی مدت (بیش از یک ماه) هر ماه آزمایش شمارش سلولهای خونی، عملکرد کلیه و کبد انجام شود.

- ✓ در صورت سابقه دیابت، احتمال افت قندخون وجود دارد، لذا از گرسنه ماندن پرهیز کنید و تعداد وعده های غذایی را افزایش دهید.
- ✓ در صورتی که پس از مصرف حداقل دوهفته از داروی هیدروکسی کلروکین دچار درد عضلانی، ضعف و بدن درد جدید شدید، به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ در صورتی که داروی تاموکسیفن استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.
- ✓ در صورت وزن کمتر از 35 کیلوگرم مقدار دارو باید بر اساس وزن کاهش یابد.
- ✓ در صورتی که سابقه فاویسم (حساسیت به باقلا) دارید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید. در برخی انواع فاویسم، طبق صلاحدید پزشک، مصرف دارو کم یا قطع می شود.
- ✓ در صورتی که قبل از تجویز دارو الکل مصرف می کردید به پزشک خود اطلاع دهید. همچنین در طول مصرف دارو الکل مصرف نکنید.
- ✓ در صورتی که بیماری (سوربازیس) و یا بیماری مادرزادی (پورفیری) دارید به پزشک خود اطلاع دهید.
- ✓ **عوارض شایعی که ممکن است تجربه کنید:**
- ✓ گیجی، سردرد، اضطراب، کاهش خفیف اشتها، کاهش وزن خفیف، اسهال، تغییر رنگ پوست و مو، ریزش مو، حالت تهوع و استفراغ، درد شکم