



بیمارستان امتیاز و فوریت های جراحی
شهید رجایی

مراقبت های بعد از عمل ختنه



تهیه کننده: خدیجه زارع

کارشناس پرستاری

تاریخ تهیه: تابستان ۹۵

تاریخ بازبینی چهارم: پاییز ۱۴۰۱

تأیید کننده علمی: جناب آقای دکتر پایدار

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ تروما

Edup-pam-21-03



با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه
می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید

نشانی: شیراز-بلوار چمران-جنب بیمارستان چمران-بیمارستان
حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: ۳۶۳۶۴۰۰۱
سایت: WWW.rajaehosp.ac.ir، لینک راهنمای مراجعین
منابع:

Medscape/emedicine/1015820-clinical
www.emedicinehealth.com/script/main
www.kangavarhosp.kumc.ac.ir/moranghebat

با آرزوی سلامتی و تندرستی

راهنمایی بالینی ختنه

در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای اسلامی این عمل شایع ترین عمل جراحی است که اکثرا در دوران نوزادی انجام میشود. ختنه در نوزادان با وزن کمتر از ۲/۵ کیلوگرم ، ناهنجاری های ارثی آلت تناسلی و در نوزادان چاق و مبتلا به فتق های بزرگ و کودکانی که اختلالات انعقادی دارند تا اصلاح و درمان این موارد نباید انجام شود.

تجویز آنتی بیوتیک لزومی ندارد و برای تسکین درد از قطره یا شیاف استامینوفن کودکان با دوز متناسب وزن می توان استفاده کرد. لازم است که در صورت خونریزی و یا هر گونه مشکلی در کیفیت ادرار نوزاد معاینه مجدد انجام شود.

در خصوص زمان انجام ختنه نظرات متعددی وجود دارد. بر اساس منبع ذکر شده متخصصین نوزادان ، بهترین زمان مناسب ختنه از حداقل ۶ ساعت پس از تولد و پس از معاینه اول نوزاد تا پیش از ترخیص از بیمارستان و حداکثر تا پایان دوره نوزادی (۲۸ روز اول زندگی) می باشد. مشروط بر

۱

اینکه نوزاد سالم باشد و وزن بالای ۲۵۰۰ گرم داشته باشد و مشکلات عدیده و خاص (مثل ناهنجاریهای مجرا و بیماریهای خونریزی دهنده در فامیل وجود نداشته باشد)



مراقبت های بعد از عمل ختنه :

- ۱- حداقل ۲ ساعت پس از انجام ختنه تحت نظر باشد.
- ۲- محل ختنه بایستی دور از آلودگی مدفوع نگهداشته شود و بهتر است در چند روز اول ، آلودگی با آب و صابون تمیز شود.

۲

- ۳- استفاده از پماد تترا سایکلین و وازلین طبی روی حلقه یا آلت روزی ۳ بار یا بیشتر
- ۴- حداقل ۷ روز پس از ختنه توسط پزشک دیده شود.

- ۵- در صورت بی قراری فرزندتان تجویز قطره استامینوفن (۲ قطره به ازای هر کیلو گرم وزن بدن)
- ۶- پوشک نوزاد حتی المقدور باز باشد و در صورت بستن ، سفت بسته نشود.

در صورت مشاهده علائم ذیل به پزشک مراجعه نمایید:

- ۱- خونریزی یا تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت و خونمردگی وسیع آلت و بیضه
- ۲- توم شدید آلت و بیضه
- ۳- نوزاد بایستی حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ختنه ادرار نماید در غیر اینصورت نیاز به مراجعه به پزشک می باشد
- ۴- عفونت محل ختنه (قرمزی موضعی و ترشح چرکی)
- ۵- سایر مواردی که به نظر والدین غیر طبیعی باشد.

۳