



بیمارستان امیاز و فوریت های جراحی
شید رجایی

مراقبت های بعد از عمل ختنه



تهیه کننده: خدیجه زارع

کارشناس پرستاری

تاریخ تهیه: تابستان ۹۵

تاریخ بازینی چهارم: پاییز ۱۴۰۲

تأثید کننده علمی: جناب آقای دکتر پایدار

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ تروما

Edup-pam-21-03



با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه
می توانید فایل متند پمبلت را دانلود نمایید

۵

با آرزوی سلامتی و قدرستی

.....
نام و نام خانوادگی / امضا فرد آموزش گیرنده:

.....
مهربانی و امضای پرستار آموزش دهنده:

۴

نشانی: شیواز-بلوار چمران-جنوب بیمارستان چمران-بیمارستان
حاج محمد اسماعیل امیاز و مرکز فوریت های جراحی شید رجایی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: ۳۶۳۶۴۰۰۱

سایت: WWW.rajaeehosp.ac.ir، لینک راهنمای مراجعین

منابع:

Medscape/emedicine/1015820-clinical
www.emedicinehealth.com/script/main
www.kangavarhosp.kumc.ac.ir/moraghebat

۳- استفاده از پماد تتراء سایکلین و وازلین
طبی روی حلقه یا آلت روزی ۳ بار یا
بیشتر

۴- حداقل ۷ روز پس از ختنه توسط پزشک
دیده شود.

۵- در صورت بی قراری فرزندتان تجویز قطره
استامینوفن (۲ قطره به ازای هر کیلو گرم
وزن بدن)

۶- پوشک نوزاد حتی المقادیر باشد و در
صورت بستن ، سفت بسته نشود.

در صورت مشاهده علائم ذیل به پزشک

مراجعه نمائید:

۱- خونریزی یا تغییر رنگ و تیره شدن نوک
آلت و خونمردگی وسیع آلت و بیضه

۲- توم شدید آلت و بیضه

۳- نوزاد بایستی حداقل تا ۲۴ ساعت پس از
ختنه ادرار نماید در غیر اینصورت نیاز به
مراجعةه به پزشک می باشد

۴- عفونت محل ختنه (قرمزی موضوعی و
ترشح چرکی)

۵- سایر مواردی که به نظر والدین غیر طبیعی
باشد.

اینکه نوزاد سالم باشد و وزن بالای ۲۵۰۰ گرم
داشته باشد و مشکلات عدیده و خاص (مثل
ناهنجریهای مجرأ و بیماریهای خونریزی
دهنده در فامیل وجود نداشته باشد)



مراقبت های بعد از عمل ختنه :

۱- حداقل ۲ ساعت پس از انجام ختنه تحت نظر
باشد.

۲- محل ختنه بایستی دور از آلودگی مدفعه
نگهداشته شود و بهتر است در چند روز اول
، آلودگی با آب و صابون تمیز شود.

راهنمایی بالینی ختنه

در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای
اسلامی این عمل شایع ترین عمل جراحی
است که اکثرا در دوران نوزادی انجام میشود .
ختنه در نوزادان با وزن کمتر از ۲/۵ کیلوگرم
، ناهنجاری های ارثی آلت تناسلی و در
نوزادان چاق و مبتلا به فتق های بزرگ و
کودکانی که اختلالات انعقادی دارند تا اصلاح
و درمان این موارد نباید انجام شود.

تجویز آنتی بیوتیک لزومی ندارد و برای
تسکین درد از قطره یا شیاف استامینوفن
کودکان با دوز مناسب وزن می توان استفاده
کرد. لازم است که در صورت خونریزی و یا هر
گونه مشکلی در کیفیت ادرار نوزاد معاینه
مجدد انجام شود.

در خصوص زمان انجام ختنه نظرات متعددی
وجود دارد. بر اساس منبع ذکر شده
متخصصین نوزادان ، بهترین زمان مناسب
ختنه از حداقل ۶ ساعت پس از تولد و پس از
معاینه اول نوزاد تا پیش از ترجیح از
بیمارستان و حداقل تا پایان دوره نوزادی
(۲۸ روز اول زندگی) می باشد. مشروط بر