



بیمارستان امتیاز و فوریت های جراحی
شهید رجایی

مراقبت های مربوط به بیمار دارای ثابت کننده های خارجی



تهیه کننده: فاطمه عباسپور

سوپروایزر آموزش سلامت

تاریخ تهیه: پاییز ۱۳۹۳

تاریخ بازبینی پنجم: پاییز ۱۴۰۲

تأیید کننده علمی: جناب آقای دکتر ابوذر فیجانی

متخصص ارتوپدی

Edup-pam-02-00

نشانی: شیراز-بلوار چمران-جنب بیمارستان چمران-
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های
جراحی شهید رجایی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: ۳۶۳۶۴۰۰۱

سایت: WWW.rajaehosp.ac.ir لینک راهنمای
مراجعه

منابع: سایت وبکیبدا-برونر سوارث ۲۰۲۲

با آرزوی تندرستی و سلامتی

نام و نام خانوادگی / امضا فرد آموزش گیرنده:.....

مهر و امضا پرستار آموزش دهنده:.....



با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه
می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید

❖ محل پین ها را از نظر علائم عفونت مثل
قرمزی، ترشح چرکی، تورم، حساسیت و شل
شدگی کنترل کنید. در صورت وجود علائم
عفونت یا شل شدن پین ها به پزشک اطلاع
دهید.

❖ البته وجود کمی ترشح بیرنگ یا زرد کم
رنگ در اطراف پین طبیعی است.

❖ دستورات دارویی پزشک را حتما رعایت
کنید و در فواصل تعیین شده از طرف
پزشک به ایشان مراجعه کنید .

❖ گاهی پس از ترمیم بافت های نرم صدمه دیده
ثابت کننده خارجی برداشته شده و درمان با
گچ یا روش های دیگر ادامه می یابد در
صورتیکه شکستگی به نحو مطلوبی با ثابت
کننده درمان شده باشد تا بهبودی کامل
استخوان نگه داشته می شود.

❖ هنگام ترخیص برگه خلاصه پرونده :شرح
عمل : کارت نوبت درمانگاه و در صورت لزوم
نسخه دارویی که به شما تحویل داده میشود
را زمان مراجعه به پزشک همراه داشته
باشید.

❖ باید بدانید که کمک در مراقبت از خود جهت
موفقیت این شیوه درمانی ضروری است.

مشکلات مربوط به دستگاه اسکلتی بدن بسیار شایع بوده و تاثیر عمیقی بر فعالیت های روزمره و طبیعی زندگی دارند یکی از درمان هایی که در جهت رفع این مشکلات استفاده میشود ثابت کننده های خارجی است.

ثابت کننده های خارجی همانطور که از نامش پیداست وسیله ای است که در خارج عضو قرار داده شده است و با استفاده از پین هایی که در قطعات شکسته استخوان قرار می دهند، شکستگی را جا انداخته و بی حرکت می کنند و سپس وضعیت پین ها را با اتصال به یک چهارچوب و با استفاده از پیچ و مهره هایی ثابت می کنند و بدین ترتیب قطعات شکسته در امتداد صحیح خود ثابت می شوند .



مزایای استفاده از ثابت کننده های خارجی:

در شرایط شما استفاده از این روش باعث راحتی بیشتر، امکان راه افتادن سریعتر و انجام ورزشهای فعال در مفاصل سالم مجاور محل صدمه دیده شده و

به این ترتیب عوارض ناشی از بی حرکتی و عدم استفاده از عضو مبتلا را به حداقل می رساند. در شکستگی های باز که همراه با آسیب شدید بافت نرم است و امکان گچ گیری وجود ندارد؛ این روش امکان درمان بافت نرم را نیز فراهم میکند. در بعضی از شکستگی های پیچیده و خردشده پزشک معالج آن را بهترین درمان برای بی حرکت کردن قطعات می داند. انواعی از آن با هدف افزایش طول استخوان بکار می رود.

مراقبت ها

- ❖ برای پیشگیری از تورم اندام با چند بالش آن را بالاتر از سطح قلب قرار دهید.
- ❖ طبق دستور پزشک طی ۴۸-۲۴ ساعت پس از عمل جراحی راه نروید.
- ❖ جهت پیشگیری از صدمه به بافتهای دیگر بدن ، نوک تیز پین ها را با باند ، پنبه و یا سرپوش های لاستیکی کوچک بپوشانید.
- ❖ هر روز انگشتان را از نظر رنگ ، گرمی ، حس و حرکت که نشانه سلامت عصبی و خونرسانی عضو است کنترل کنید و در صورت رنگ پریدگی عضو؛ سردی؛ نداشتن حس در انگشتان و عدم توانایی در تکان دادن انگشتان به پزشک مراجعه کنید.

- ❖ به هیچ عنوان پیچ ها و گیره ها را دستکاری نکنید.
- ❖ هر روز ورزشهای بدن و عضو مبتلا را که توسط فیزیوتراپ به شما آموزش داده شده است انجام دهید تا عضلات عضو ضعیف نشوند.
- ❖ عضلات عضو مبتلا را ۵ تا ۱۰ ثانیه منقبض کنید و سپس شل سازید ، این کار را چند بار در روز انجام دهید.
- ❖ در صورت وجود درد عضو را بالاتر از سطح قلب قرار دهید و از داروهای مسکن تجویز شده توسط پزشک استفاده نمایید.
- ❖ درد شدیدی را که با روشهای فوق درمان نشد به اطلاع پزشک برسانید.

برای جلوگیری از عفونت مسیر پین ها آنها را به روش زیر مراقبت کنید:

- ❖ به روش استریل کار کنید و قبل از شروع به کار دستهای خود را کاملاً با آب و صابون بشوئید.
- ❖ گیره های روی چهارچوب ثابت کننده ی خارجی را دست کاری نکنید.

❖ هر روز محل پین ها را با پنبه یا گاز تمیز
اغشته به سرم شست و شو تمیز کنید. برای
هر پین از یک گاز یا پنبه استفاده کنید.