



واحد آموزش به بیمار
تهیه کننده علمی: دکتر امیرضا دهقانیان - فلوشیپ
مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک متخصص پاتولوژی
جراحی و کلینیکال
تاریخ تهیه: تابستان 1401
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله متدهای
آزمایشگاهی 2022 - هنری دیویدسون 2022

1. این نمونه جهت تشخیص باکتری ها جمع آوری می شود و بهترین نمونه اولین نمونه ادرار صبحگاهی است.
2. بیماران باید قبل از آزمایش از نوشیدن زیاد مایعات خودداری نموده و دست ها را با آب و صابون شسته و به خوبی خشک کنند.
3. این روش نیازمند تمیز کردن منفذ ادرار با آب و سپس خشک کردن منفذ با دستمال می باشد این کار را دوبار انجام داده و دستمال قبلی را دور بیندازنند.
4. پس از آن بیماران باید قسمت اول ادرار (۲ ثانیه اول) را دور ریخته و قسمت وسط ادرار را به میزان حداقل نصف ظرف جمع آوری نماید.
5. در حین نمونه گیری دقیق نماید که درب ظرف روی زمین نیافتد.
6. دست یا هر قسمت دیگر بدن با داخل ظرف تماس پیدا نکند.
7. بعد از نمونه گیری، نمونه را سریع به آزمایشگاه تحويل داده تا ظرف مدت ۱ ساعت کشش داده شود.