



دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز  
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

Edup-pam-88-00

جمع آوری نمونه ادرار در اطفال



1. نمونه های ادرار در اطفال و کودکان زیر ۲ سال با استفاده از کیسه های ادراری مخصوص صورت می گیرد.
2. قبل از چسباندن کیسه منفذ و پوست اطراف منفذ را با آب و صابون تمیز شسته و با دستمال خشک کنید.
3. بهتر است کیسه را هنگام خواب به کودک وصل کنید و پس از قرار دادن کیسه تا زمان جمع آوری ادرار هر ۱۵ دقیقه کیسه را بررسی نمایید تا جدا نشود.
4. زمانی که میزان ۱۰-۱۵ میلی لیتر ادرار در کیسه جمع آوری شد باید فوراً کیسه را جدا کرده و آنرا تا کرده و جهت انتقال با چسب خودش بچسبانید و سریع آنرا به آزمایشگاه برسانید .
5. در غیراینصورت کیسه را در ۲ نایلون گذاشته و حداکثر به مدت ۶ ساعت در یخچال نگه دارید و سپس به آزمایشگاه منتقل کنید.

واحد آموزش به بیمار  
تهیه کننده علمی: دکتر امیررضا دهقانیان - فلوشیپ  
مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک متخصص پاتولوژی  
جراحی و کلینیکال  
تاریخ تهیه: تابستان ۱۴۰۱  
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله مندهای  
آزمایشگاهی ۲۰۲۲ - هنری دیویدسون ۲۰۲۲

**توجه:** حتماً روی کیسه برچسب مربوط به  
آسم و نوع آزمایش و کد پذیرش بیمار قید  
شده باشد.