



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

Edup-pam-98-00

نمونه گیری کامل ادرار



1. برای جمع آوری نمونه، اول صبح که غلیظ تر است مناسب ترین است .
2. بیمار باید قبل از رفتن به بستر مثانه را تخلیه نماید و بلافاصله بعد از بیدار شدن نمونه ادرار را جمع آوری کند.
3. قسمت اول آن یعنی (۲ ثانیه اول) را دور ریخته و قسمت وسط ادرار را در ظرف نمونه گیری به میزان حداقل نصف ظرف جمع آوری نماید
4. نمونه را طی مدت حداکثر ۱ ساعت به آزمایشگاه تحویل دهد.
5. توجه کنید قبل از نمونه گیری از مصرف زیاد مایعات خودداری نمایید

راهنما جهت نمونه گیری ادرار بیماران دیابتی

1. با این روش گلوکز و کتون ادرار کنترل می شود و بیمار باید ابتدا مثانه خود را تخلیه نماید .
2. کمی بعد از آن دوباره ادرار نماید که نمونه دوم تازه تر است و برای آزمایش استفاده می شود که در آن زمان خاص غلظت اجزاء دقیق تر مشخص می شود .

واحد آموزش به بیمار
تهیه کننده علمی: دکتر امیررضا دهقانیان-فلوشیپ
مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک متخصص پاتولوژی
جراحی و کلینیکال
تاریخ تهیه: تابستان 1401
منبع: تشخیص بالینی و مدیریت به وسیله متدهای
آزمایشگاهی 2022 - هنری دیویدسون 2022